

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 27-7-81818716

BULLETIN  
TECHNIQUE  
DES  
STATIONS  
D'AVERTISSEMENTS  
AGRICOLES

PUBLICATION PERIODIQUE  
CPPAP N° 523 AD

## EDITION DE LA STATION « ALSACE ET LORRAINE »

(BAS-RHIN, HAUT-RHIN, MEURTHE-ET-MOSELLE, MEUSE, MOSELLE, VOSGES)

## SERVICE DE LA PROTECTION DES VEGETAUX

Cité Administrative - 67084 STRASBOURG CEDEX  
Tél. (88) 61 49 50 Poste 457

**ABONNEMENT ANNUEL:** 70 F

Régisseur de recettes D.D.A.  
2, rue des Mineurs  
67070 STRASBOURG CEDEX  
C. C. P. STRASBOURG 5.508.00 F

Bulletin n° 21

24 juillet 1981

### VIGNE

#### TORDEUSES DE LA GRAPPE

Les vols des papillons de deuxième génération se poursuivent, et tout laisse à penser qu'ils vont se prolonger. Les pontes s'intensifient depuis le 21 juillet dans les secteurs où l'Eudémis prédomine, plus particulièrement dans le sud du vignoble Bas-Rhinois et dans le Haut-Rhin.

Les premières éclosions sont observées depuis le 20 juillet dans les secteurs à Cochylis (RIBEAUVILLE, RIQUEWIHR, MITTELWIHR...) et depuis le 22 juillet à ROUFFACH et WESTHALTEN.

La lutte contre les tordeuses de la grappe de cette deuxième génération doit être menée avec le souci d'une efficacité maximale, afin de réduire l'installation de foyers de pourriture grise (Botrytis) qui, d'ailleurs, commencent à s'observer sur grappes (Riesling, Pinot, Gewurtztraminer, Sylvaner).

Pour les viticulteurs n'ayant pas effectué un traitement préventif, le traitement avec des produits de type semi-curatif ou curatif (lannate, acéphate, parathion...) est conseillé dans les périodes suivantes :

- dès réception dans les vignobles où la cochylis prédomine (CLEEBOURG, RIQUEWIHR, MITTELWIHR, SIGOLSHEIM, TOULOUS) ainsi que dans les secteurs précoces à dominance Eudémis (ROUFFACH, WESTHALTEN, BOLLENBERG...),

- du 27 au 29 juillet dans le Haut-Rhin et le sud du Bas-Rhin,

- du 28 au 30 juillet dans le Bas-Rhin.

#### TETRANYQUES (araignées rouges et jaunes)

Des pullulations d'araignées provoquent, dans certains secteurs, le vieillissement prématuré du feuillage. Une surveillance s'impose dès maintenant. On interviendra si plus de 30 % des feuilles sont occupées par au moins une forme mobile d'araignée rouge ou d'araignée jaune.

Dans le sud du vignoble, certaines parcelles sont infestées d'araignées jaunes. Dans ce cas, intervenir sans tarder avec un acaricide spécifique, sans mélange avec d'autres produits.

#### OIDIUM

Attention à cette maladie qui semble trouver en ce moment des conditions climatiques très favorables à son développement.

GRANDES CULTURES

- BETTERAVES -

MONTÉES A GRAINES

De nombreuses betteraves, montées à graines, sont visibles. Il convient d'éliminer ces hampes florales sans tarder.

- MAIS -

PUCERONS

Dans la plupart des situations, les populations de pucerons sont en forte régression. Comme on note la présence de nombreux auxiliaires (syrphes, chrysopes...), il n'y a pas lieu d'envisager, dans l'immédiat, de traitement insecticide dans ces situations.

PYRALE

Le vol s'est ralenti et les nouvelles pontes sont limitées. Dans la majorité des situations, il est trop tard pour intervenir avec efficacité.

- HOUBLON -

MILDIOU

La situation sanitaire vis-à-vis de cette maladie reste satisfaisante dans l'ensemble. Mais, compte tenu de la période perturbée que nous venons de traverser et du stade de grande sensibilité auquel se trouve actuellement le houblon, il est recommandé de reconduire la protection fongicide dans les meilleurs délais.

OIDIUM

Cette maladie s'est manifestée localement sur feuilles, inflorescences et cônes, à partir de la deuxième quinzaine de juillet, surtout sur la variété Northern-Brewer. Dans les parcelles atteintes, joindre un anti-oidium à action curative (bupirimate, triadiméfon...) à la bouillie anti-mildiou.

PUCERONS

Surveiller les cultures et joindre, si nécessaire, un aphicide à la bouillie anti-mildiou.

- POMMES DE TERRE -

MILDIOU

Par suite des pluies fréquentes, le mildiou commence à prendre une certaine extension dans les cultures, notamment sur variétés sensibles. Renouveler la protection dès réception du présent bulletin.

CULTURES MARAICHÈRES

- POIREAU -

TEIGNE DU POIREAU

Le troisième vol, contrôlé par élevage et piégeage sexuel à l'aide de femelles vierges (en liaison avec l'I.N.R.A. de COLMAR) a débuté le 17 juillet. Le renouvellement du traitement est conseillé dans la période du 29 au 31 juillet. Pour le choix des produits, se référer à notre bulletin n° 12 du 22 mai 1981.

Nous rappelons que les délais d'emploi des produits avant la récolte doivent être scrupuleusement respectés. Ces délais figurent sur les emballages et notices d'emploi.

.../...

- TOMATE -

MILDIOU

Un nouveau traitement fongicide est conseillé sur cultures de plein air.

PETITS FRUITS

- FRAMBOISIER -

DESSECHEMENT DES RAMEAUX

La récolte étant terminée, la suppression des pousses fructifères est vivement recommandée dès à présent. Les travaux de taille permettront d'aérer les plantations. Ne garder que cinq à six tiges par mètre liénaire. Faire suivre par une pulvérisation soignée d'une bouillie à base de Dithane M 45 ou d'organo-cuprique.

ACARIENS

Des dégâts de phytoptes (*Eriophyes gracilis* Nal.) sont actuellement observés dans de nombreuses plantations de framboisiers, sur les pousses de l'année. Ils sont à l'origine de l'apparition de "taches" jaune-citron sur les feuilles, pouvant être confondues avec une mosaïque.

Si de tels symptômes sont observés, intervenir avec un produit systémique sur les variétés ayant terminé leur production. L'oxydéméton-méthyl (Métasystémox, Anthonox) est particulièrement recommandé.

REPONDEURS TELEPHONIQUES

- Alsace : (88) 60.30.10 (conseils céréales, colza, maïs, vigne)
- Lorraine : (8) 337.45.98 (conseils céréales, colza, arbres fruitiers)
- Répondeur téléphonique de la Météorologie de MEYENHEIM (spécial vigne Haut-Rhin) : (89) 81.04.47.

Le Chef de Circonscription Adjoint  
Circonscription Phytosanitaire  
"ALSACE et LORRAINE"

J. GENNATAS

P 312